CASO CLÍNICO N°3

3. Seleccione la respuesta correcta según el caso

3.1-Un niño de 18 meses de edad presenta un cuadro de dos días de vómito intermitente e irritabilidad. En la exploración física parece incómodo, tiene plenitud en el cuadrante inferior derecho del abdomen y en el pañal hay heces en "jalea de frambuesa". ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

- A. Estreñimiento
- B. Gastroenteritis
- C. Intususcepción
- D. Divertículo de Merckel
- E. Vólvulo

3.2 Una lactante de tres días de edad es llevada a la clínica por estreñimiento. Ella nació a término y fue llevada a casa en el lapso de las siguientes 24 horas. No ha evacuado desde que nació. Ha sido bien alimentada al pecho materno y no ha tenido vómito. Su madre piensa que su abdomen está distendido. En la exploración física el peso del bebé es igual a su peso al nacer. Su abdomen está distendido y no hay otros datos anormales. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

- A. Estenosis duodenal
- B. Atresia esofágica
- C. Estreñimiento funcional
- D. Enfermedad de Hirschsprung
- E. Falla en la alimentación al pecho materno

3.3.- Masculino de seis meses de edad es llevado a la clínica con un cuadro de un día de hemorragia rectal. No ha tenido dolor, malestar ni otros síntomas. En la exploración física aparece en buen estado. Su abdomen es normal. El pañal que los padres llevan consigo está lleno de sangre roja oscura. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

- A. Fisura anal
- B. Intususcepción
- C. Divertículo de Merckel
- D. Intolerancia a la proteína de la Leche.
- E. Vólvulo

TAREA N°3

INVESTIGAR Y REDACTAR DE FORMA BREVE: EN BASE A LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA CORRESPONDIENTE.

A) Diferencias clínicas entre infección de vías respiratorias superiores aguda y resfriado común. En pacientes de 3 meses a 18 años.

- B) características clínicas de infección por Streptococcus pyogenes y cuál es el estándar de oro para su diagnóstico.
- c) características clínicas de la rinitis alérgica.
- d) Síntomas que indican infección respiratoria grave.
- e) Cual es el Tratamiento farmacológico (Posología) y no farmacológico de la faringitis aguda mas recomendado.
- f) cuales son las tres patologías de IVRA que requieren manejo antibiótico inmediato.

NOTA: LAS TAREAS INCLUYENDO LAS RESPUESTA DEL CASO CLÍNICO DEBERÁN SER ENTREGADAS EN ELECTRÓNICO FORMATO PDF CON LOS DATOS GENERALES DEL ALUMNO. (NOMBRE Y MATRICULA). RECOMENDAMOS GUARDES UN PORTAFOLIO DE TAREAS ELECTRÓNICO PARA CUALQUIER ACLARACIÓN

LE RECORDAMOS QUE LA REALIZACIÓN DE TAREAS ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO. EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA LIBERACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL.

COORDINACION DE SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL